

När ska mitt barn stanna hemma från förskolan?

- * När allmäntillståndet är påverkat, dvs. barnet är hängigt, äter och sover dåligt. Tänk på att barnet ska orka delta i förskolans normala verksamhet, som kräver mer ork än en dag hemma.
- * Vid smittsam bakteriell infektion som behandlas med antibiotika t.ex. streptokockinfektion (minst 2 dygn efter insatt antibiotikabehandling).
- * Vid feber. Barnet ska ha en feberfri dag innan det återgår till förskolan.
- * Vid maginfluensa (plötslig diarré med eller utan kräkningar). Barnet ska stanna hemma minst 48 timmar efter sista kräkning eller diarré. Syskon ska stanna hemma.
- * Vid impetigo/svinkoppor, små blåsor som blir variga och växer, oftast runt mun och under näsan.
- * Barnet ska stanna hemma så länge blåsorna vätskar och tills sårskorpan fallit av. Vid antibiotikabehandling, minst 2 dygn.
- * Vid ögoninfektion, variga och röda ögon. Barnet stannar hemma tills symtomen upphört.

Sjukanmäl ert barn till förskolan senast kl. 07.30 på morgonen och friskanmäl senast kl. 15.00 dagen innan barnet återgår till förskolan.

Småfötternas förskola, tel.nr. 0701 491 770

